

## NOMENCLATURA DE RESPUESTA TERAPÉUTICA DE LA POSTINTERVENTION STATUS SCALE DE LA MGFA

Remisión Clínica (RC)	Ausencia de síntomas de MG durante más de un año, sin haber recibido ningún tipo de tratamiento en este periodo. La exploración física no demuestra ningún tipo de debilidad exceptuando debilidad aislada de la oclusión palpebral que se aceptada para este status.
Remisión Farmacológica (FR)	Los mismos criterios que la RC, pero el paciente sigue tomando algún tipo de tratamiento para la MG. No se acepta para este status que los pacientes continúen con anticolinesterásicos.
Manifestaciones mínimas (MM)	No existen síntomas o limitaciones funcionales derivadas de la enfermedad, pero la exploración física demuestra algún tipo de debilidad muscular leve.
MM-0	El paciente no toma ningún tratamiento desde hace más de un año
MM-I	El paciente sigue tomando algún tipo de inmunosupresor pero no colinesterásicos
MM-II	El paciente toma anticolinesterásicos, dosis bajas (<120mg/día de piridostigmina) pero ningún inmunosupresor al menos durante un año
MM-III	El paciente continúa tratamiento con algún tipo de anticolinesterásico y inmunosupresor
Mejoría clínica	Existe una mejora sustancial en los síntomas respecto a la situación previa al tratamiento, pero el paciente no cumple criterios de MM
Sin cambios (U)	No existen cambios sustanciales ni en la clínica ni en la medicación de los pacientes.
Empeoramiento	Pacientes que han llegado a cumplir criterios de RC, FR o MM pero posteriormente han empeorado notablemente
Muerte por la Miastenia	Pacientes que han muerto por culpa de síntomas derivados de la enfermedad, por complicaciones de los fármacos que se dan para la enfermedad o bien 30 días después de la timectomía